

Bestand af ældre Østers, og Banken vil næppe i de første Aar komme til Kræfter, da der synes at være meget lidt Yngel.

Venø Bugt. Udfør Lune og Hærup fandtes særdeles god Opvært af 2- og 3-aarig Yngel. Haastrup Banken og Lokaliteten udfør Nygaard's Hage ere i god Stand og rigt besatte med Yngel fra 1—3 Aar. Udfør Eising findes Intet. Sandbjerg og Volstrup Banken er meget lovende, der findes fortrinlig Yngel-Opvært, især 2- og 3-aarig.

Ved Brald ligeledes megen Yngel. Østen Venø: Paa de sydligste Lokalteter findes ret god Bestand af yngre Østers med rigelig Yngel, især 1- og 2-aarig. Nordligere (S. f. Klov Vig) ligeledes god Opvært med 3-aarig. Vesten Venø: Fra Nordkysten til Kønshjør Odde god Bestand af 2—3-aarige Ungøsters. Ved Sønerflovtrøg ligeledes. Hele Strækningen fra Sandbjerggaard til Grisetaa Odde (Odde Sund) fandtes godt besat med 2-aarig Yngel (næsten ajennemgaaende fastsiddende paa Buccinum undatum). Strækningen N. f. Loubjerg Odde og Bugten S. f. denne lykkedes det os ikke at faae undersøgt tilstrækkeligt, dels paa Grund af Nedgarn, dels fordi vi af Storm bleve drevne derfra. Da begge Lokalteter ere uden Betydning, fandt jeg det ikke værdt at ofre længere Tid derpaa.

Undersøgelserne paa den lille Blet ved Indløbet til Skibted Fjord førte heller ikke til noget Resultat, idet Storm og lav Vandstand tvang os til at forlade Stedet efter et Par frugtesløse Forsøg paa at strabe med Travl.

Ved Futterup fik vi kun Dødtang; der findes vistnok saa godt som ingen Østers. Derimod var der fuldt op af Yngel paa Meilgrunden ved Ørdrup Hage, i Tæbring Vig og ved Skum Hage, især 2- og 3-aarig, desuden syntes der at være god Bestand af 4-Aars Østers.

I Vil Sund findes langs Mors en Del yngre Østers med god Opvært af 3-aarig og tildels 2-aarig Yngel.

Thisted Bredning: Udfør Gulderup og ved Trange Hage er Tilstanden meget lovende; der findes mange yngre Østers og — navnlig ved Trange Hage — rigelig Yngel i en Alder af 2—3 Aar.

Paa Stjærhøf Banken og Skarre Hage traf vi udmærket Bestand med særdeles megen Yngel fra 1—3 Aar. Paa Blødebanken udfør Sennel's fandtes megen Dødtang, men desuagtet beholdt vi adskillige Østers, blandt hvilke en Del 2—3-aarig Yngel. Udfør Taarstof og S. f. Thisted Havn traf vi en god Bestand af yngre Østers og rigelig Opvært af 3-aarig Yngel. Ved Silstrup og paa Holmen findes for Tiden saa godt som ingen yngre Østers. Et Par yngre Individuer udgjorde hele Udbyttet af vore Strabninger.

Nissum Bredning. Humlum Bankerne ere godt besatte med 1- og 3-aarig Yngel. Udfør Rimmen beholdtes Intet med Undtagelse af en enkelt Ungøsters; men Windstille og Tang hindrede Strabningen. Ved Nissum Odde fandtes en ret anseelig Bestand af 2- og 3-aarig Yngel; de ældre vare i en meget slet Forfatning, magre, vandede og med Skaller, som vare stærkt medtagne af den borende Clione=Svamp. S. f. Rønne traf vi kun sparsom Yngel fra forrige Sommer, ingen yngre. Øst og Vest for Rønne beholdtes kun en ringe Mængde 3-aarig Yngel, og paa det udstrakte Terrain Nord for Rønne fandtes kun sparsom Yngel fra de to sidste Aar. Men sandsynligvis hidrører det mindre gode Udfald af vore Strabninger og andre Undersøgelser paa disse Lokalteter fra den Omstændighed, at Bunden var stærkt overfyldt med levende Tang („Parruffer“), der dog ikke udøver nogen skadelig Indflydelse paa Østerferne. Ved Geller Odde var der pletvis ret godt med 2-aarig Yngel. Fra Hilligsø langs Nordostkysten af Bredningen fandtes der overalt paa Bankerne rigelig Yngel fra 1 til 3 Aar.

Endnu skal jeg kun tilføje, at jeg, efter at have affluttet min egentlige Undersøgelse, paa Tilbagereisen stoppede D. f. Løgstor for at efterse de gamle Lokalteter ved Sønderlø og udfør Marbjerg Tunge, men at det hverken det ene eller det andet Sted lykkedes mig at træffe en eneste Østers.

Det vil af foranstaaende Meddelelse fremgaa, at Bredningen, der nu har været i 3 Aar, har haft en overordentlig gavnlig Indflydelse paa Bankernes Tilstand. Men at have Bredningen nu vilde være det Samme som at ødelægge Udsigterne for det fremtidige Østersfiskeri. Det skal indrømmes, at paa adskillige Lokalteter er en Del af den under Bredningsperioden fremkomne Yngel allerede saa vidt fremfæden, at den om et Aars Tid