

Nordjøens Rødspætterace er jo en stor Race; formodentlig omtrent lige saa stor som Islands. W. Fulton angiver saaledes ved Skotlands Kyster, at Rødspætten naar indtil 28 engelske Tommer i Længde og først i det tidligste bliver moden ved en Længde af 12 eng. Tommer. Østersøens Rødspætter og enkelte fra Kattegat blive allerede modne ved 7 Tommer.

I Kattegat optræder imidlertid sikkert større og mindre Racer blandede sammen, og de kunne der ikke ret vel stelles fra hinanden uden ved et rent Skøn paa Tabellerne.

Omend det saaledes maa anses for rimeligt, at de islandske Rødspætter paa Tabel IX repræsentere en gennemsnitlig noget større Race, end den Kattegatsrødspætterne i Almindelighed kunne siges at tilhøre, saa er det dog utvivlsomt, at disse sidste ere særdeles smaa, og de have næppe altid været saa smaa, som de for Øjeblikket ere. Desværre kan jeg ikke give bestemte Maal her, Undersøgelserne maatte da have været paabegyndte for ca. 10 Aar siden, men jeg tror ikke, at nogen kyndig Mand, der personlig har haft med Fiskeri at gøre i denne Narvække, vil benægte det Faktum, at Rødspætten i Kattegat er aftaget i Størrelse i de seneste Aar, hvis han vil tale efter sin Overbevisning. Jeg skal senere komme tilbage til denne Sag.

Det er selvfølgelig ikke min Mening, at der ikke findes store Rødspætter i Kattegat endnu; thi der findes stedse saadanne, naar Fiskerne komme ud paa de dybe Steder i det østlige Kattegat; hvor der af forskellige Grunde har været mest Fred at finde for Rødspætten; men jeg mener, at man nu skal søge adskilligt mere efter saadanne store Fisk end for 10 Aar siden, og at de paa flere, de fleste, Fiskepladser, hvor de før almindelig fandtes, nu næsten ikke ere at opdribe.

Fiskerne have i Danmark et eget Navn for de store, ofte magre og ikke særlig velsmagende Rødspætter: „Hanser“, Pl. borealis hos de ældre Forfattere (Gottsche, Faber); enkelte Steder kaldes de „Præsteflyndere“; disse ere aabenbart blevne sjældnere i Kattegat i de seneste Aar som en Følge af Opfiskning. Men ogsaa de Rødspætter, der ere de næste i Rækken i Henseende til Størrelsen, som netop afgave en værdifuld Handelsvare, Rødspætter omtrent paa 20—30 Pd. Snesen (svarende til 12—18 Tommers Længde) ere blevne sjældnere, og de saa bekendte „Frederikshavns-Rødspætter“, der i Henseende til Størrelse og Godhed vare saa berømte, ere nu næsten en Saga.

For at fange Rødspætter paa 18—24 Pd. Snesen maa man nu over under den svenske Kyst (eller ud af Kattegat), hvor man aldeles ikke forstod at fiske for 10 Aar siden paa Grund af det dybe Vand. Paa de gamle Fiskepladser fanges mest Rødspætter til en Vægt af 9—15 Pd. Snesen (svarende til Længder fra 10 $\frac{3}{4}$ —13 Tommer).

Formodentlig var det paa Grund af denne Nedgang i Rødspætternes Størrelse, at Fiskehandelen i Kattegat i 1884 gik over fra at bruge Snesen som Enhed og valgte Pund i Stedet; og netop fordi man i ældre Tid ikke vejede Rødspætten, er det nu umuligt at erholde Oplysninger i bestemte Tal om dens Middelsstørrelse for ca. 15 Aar siden; kun saadanne Udtalelser, som følgende, har jeg kunnet staafe til Veje: En Fisker, der ejer 2 Kvaer, fortæller, at den ene af dem lastede „i ældre Tid“ 70 Sneser Rødspætter; men nu kan den (skont ikke gjort større) laste 300 Sneser, saa smaa ere de blevne.

Egentlige statistiske Beviser for Rødspættens Aftagen i Størrelse kan jeg saaledes ikke give, — de ville dog desværre næppe savnes.

Det er, som her udviklet, ikke lykkedes mig at fiske 3-Gruppen af Rødspætter i Kattegat med egne Redskaber saa talrig, at den har kunnet gøre sig gældende over for 2-Gruppens største Individier paa Tabellerne, og jeg maa derfor nøjes med at henvise til Tabel I, der indeholder Fiskernes Fangster af 3-Gruppen; men da de jo ikke fange de smaa Fisk med, og da Tabellens Individier hydeligere ere forterede som Regel, viser Tabellen ikke denne Gruppens Forhold til 2-Gruppen. —

I Østersøen synes 3-Gruppen ogsaa lidet talrig, sammenlignet med de mindre Grupper (Tabel VII og VIII), hvilket, da her (d. v. s. Øst for Sjælland og Falsler) ikke fiskes efter Rødspætter i betydelig Grad, maatte nok tør thydes som et Tegns paa, at de større Fisk vandre ud fra disse Farvande.

I Store Bælt ved Kerteminde (og i Lille Bælt) (se Tabel II) synes en 3-Gruppe, bestaaende af modne Fisk derimod ikke sjældnen og i hvert Fald det første Sted (Kerteminde) langt rigeligere repræsenteret end 2-Gruppen, der næsten ganske synes at mangle her; thi Tabel II, Kolonne 9, giver et efter mine Erfaringer godt Billede af Mængdeforholdene indenfor de to Grupper i Bæltet. Skulde disse modne Rødspætter virkelig repræsentere Hovedmængden af de modne Fisk paa Udvandring fra Østersøen? Fisk, der altsaa som smaa skulle være indvandrede til Østersøen fra Kattegat og Bæltene?