

Fiskeri (Kerteminde, Fæno) eller den er, som i Østersøen, lidet talrig (og maaste delvis tydet for gammel).

At der i Kattegat (og Limfjorden) ingen saadan 3-Gruppe kan paavises, er paafaldende, og at Fiskerne i Marts 1892 (Tabel VI, Kolonne 8) heller ikke kunne paavise en saadan trods ivrig Østersøgen af hele Fiskerflaaden, det har jeg deres Ord (og Gerning) for; men at der dog i mindre Antal findes store Fisk i Kattegat, det kan ses af Tabel I.

Naar 3-Gruppen derfor mangler i Kattegat, maa det have sin Grund i, at de store Rødspætter ikke ere talrige nok til at vise en saadan; thi en 3-Gruppe maa der komme, hvis Rødspætten overlades til sig selv; dette kan man slutte dels i Analogi med de andre Fisk (Strubber og Svinger), dels fordi en saadan allerede er at spore i Farvandet mod Syd, hvor Rødspættefiskeriet ikke drives synderlig kraftigt.

For at se, hvorledes Rødspættebestanden ser ud paa Steder, hvor der ikke har været fisket kraftig i en længere Aarrække, forstaaede jeg mig Maalinger af Rødspætter fra de islandste Fjorde (Tabel IX). Disse ere fangede af Fiskerne med stormasket Snurrevaad udelukkende i den Hensigt at fange saa mange og saa store Fisk som muligt i den kortest mulige Tid. De smaa Aargange 0 og 1 ere derfor aldeles ikke repræsenterede paa Tabellen (de gaa gennem Maaskerne), og 2-Gruppen er ogsaa sparsom, da man selvfølgelig har søgt mest efter 3-Gruppen. At det er denne, der er saa kraftig repræsenteret paa Tabel IX ved Fisk paa ca. 17—29 Tommer, kan jeg ikke bevise, men det maa vel være 3-Gruppen, hvis ikke Rødspætten skal have en 4-Gruppe; og herpaa er der intet der tyder.

Jeg skal tilføje, for at forebygge Misforstaaelse, at medens Rødspættene paa Tabel I ofte ere udjøgne af en stor Mængde Fisk, altsaa ikke repræsenterer nogle i Naturen forekommende Størrelsesgrupper, ere Fiskene paa Tabel IX maalte ufortærede, netop som de kom op med Vaadde. Da dette var stormasket, fangedes blot ikke Individierne under ca. 8—10 Tommer.

I nogle af de islandste Fjorde er der altsaa en 3-Gruppe, men den savnes i Kattegat. Det kunde jo tænkes, at den vandrede ud fra Kattegat ligesom den synes at gøre fra Østersøen og Limfjorden, men dette er lidet rimeligt at antage, 1) fordi der jo endnu findes Spor af en 3-Gruppe i Kattegat i saadanne store Fisk, som ikke i Størrelse kunne komme lige efter 2-Gruppen, men ere meget større (21—22 Tommer lange), (se Tabel I); disse store Fisk findes paa de Steder, hvor Snurrevaadde til Dato har været mindst brugt, fordi der har været snart for dybt Vand, snart fuldt med Sten paa Bunden; 2) man kan erindre, at Rødspættene vare større i Kattegat for saa Aar siden, end de ere nu. — Dette sidste er noget, som enhver, der har haft med denne Sag at gøre i en Aarrække, har set; ja Forbrugerne, der kun spise Fisk, kunne ogsaa tale med derom; bevises med Tal kan det dog ikke; thi ingen har, mig bekendt, opskrevet for 10—15 Aar siden, hvad Rødspætten plejede at veje i Kattegat — ej heller ere de blevne maalte*).

Jeg beklager meget, at dette ikke er sket; thi jeg er nu nødt til at tro paa dette og vise, hvorledes denne Tro stemmer godt med de Fænomener, der ellers fremkomme til Belysning af denne Sag.

Naar 3-Gruppen af Rødspætter og Svinger er saa sparsom i Kattegat, sammenlignet dels med de islandste Fjorde for den forstes Bedkommende, dels med vore lukkede Farvande, tror jeg, det hidrører fra, at den er fisket op, for Rødspættens Bedkommende med Vilje for at sælge den, for Svingens Bedkommende hovedsagelig ufrivillig, da denne Fisk i Handelen spiller en aldeles underordnet Rolle. Da Svingen imidlertid er en temmelig lidet sejlivret Fisk, ere Individierne i Reglen blevne dræbte under Fangsten; men dels er Svingen mindre end Rødspætten, dels er den ikke med Vilje opjagt, begge Dele have medført, at den ikke har lidt saa meget som Rødspætten, saa at den dog endnu kan fremvise en 3-Gruppe paa flere Steder.

Strubben er ikke efterstræbt med de store Fartøjer, dels fordi den lever mere indenstærs, dels fordi den i den store Handel er temmelig værdiløs; bl. a. derfor er denne Fisk saa hyppig repræsenteret ved sin 3-Gruppe; dens Livsforhold (Opholdet i først Vand) kunde maaste ogsaa bidrage til dette Fænomen.

*) Anm.: Se dog senere Kapitel II.