

tive betingelser, hvorunder kronisk sygdom er medtaget. Barselstilfælde og sygdomme i forbindelse med graviditet udgør 10 pct. af sygdomsperioderne, og ulykkestilfældene udgør også ca. 10 pct. Godt halvdelen er andre former for sygdomstilfælde.

Tabel 5.6. viser fordelingen på sygdomsbetingelser.

Tabel 5.6. Samlet antal sygeperioder relativt fordelt på sygdomsbetingelser.

	Pct.
1 (1) Hospitalsophold	15
2 (2) Sengeliggende hjemme og/eller fravær fra arbejde	50
3 Kombinationer af (1) og (2)	10
4 (4) Passer arbejde trods høj feber, trods lægeforbud eller trods væsentlige gener	16
5 Kombinationer af (1) og (4)	1
6 — - (2) og (4)	6
7 — - (1), (2) og (4)	2
8 I alt	100
9 Antal sygeperioder	269

I $\frac{2}{3}$ af sygdomstilfældene har sygdommen resulteret i sengeleje hjemme og/eller fravær fra arbejde. Indlæggelse på hospital har der været tale om i godt $\frac{1}{4}$ af sygdomstilfældene. At den sygdomsramte interviewperson har passet sit arbejde på trods af høj feber eller på trods af lægeforbud eller på trods af andre ganske betydelige vanskeligheder, forekommer som eneste sygdomsbetingelse i ca. $\frac{1}{6}$ af tilfældene og sammen med andre betingelser i ca. $\frac{1}{10}$ af tilfældene.

Anstrengelserne for kun at medtage de mere markante sygdomstilfælde synes i det store og hele at være lykkedes. Dette sandsynliggøres bl. a. af, at ca. 75 pct. af de syge havde haft kontakt med en hospitalslæge eller en praktiserende læge i det akutte sygdomstilfælde.

Sygdomstilfældenes fordeling på varighed fremgår af tabel 5.7.

Der er en tydelig tendens til ophobning af besvarelser på „runde“ varigheder, hvilket hænger sammen med, at man ofte har fået varigheden angivet som „et par dage“, „et par uger“ etc.

Tabel 5.7. Samtlige sygeperioder fordelt efter varighed og efter, om sygdomstilfældet var overstået på interviewtidspunktet. Absolutte tal.

	1	2	3
	Ikke afsluttet på interviewtidspunktet	Afsluttet på interviewtidspunktet	I alt
1			
1 dag	—	4	4
2 dage	—	11	11
3 -	—	29	29
4 -	—	11	11
5 -	—	16	16
6 -	—	14	14
7 -	—	15	15
8 -	1	33	34
9 -	—	3	3
10 -	—	15	15
11 -	—	2	2
12 -	—	6	6
13 -	2	1	3
14 -	—	20	20
15-20 -	3	8	11
21-25 -	2	15	17
26-30 -	5	11	16
31-35 -	4	3	7
36-40 -	3	1	4
41-50 -	6	7	13
51-60 -	3	1	4
61-70 -	—	2	2
71-80 -	1	—	1
2 Over 80 dage	6	—	6
3 Ikke klassificerbar	—	—	5
4 I alt sygdomsperioder	36	228	269

Sammenligner man de her behandlede socialbegivenheder sygdoms- og ulykkestilfælde på den ene side og arbejdsløshed på den anden, viser tallene klart, at sygdom og ulykke er helt dominerende. Man kan på basis af de fundne sygdomsfrekvenser beregne, at omkring hver 3. dansker i aldersgrupperne 18-66 år rammes af sygdom hvert år. Det tilsvarende tal for arbejdsløshed er under 5 pct.

Mens der således er væsentlig forskel på den hyppighed, hvormed arbejdsløshed og