

## SUNDHEDSSTYRELSEN

## Bilag B.

## Retningslinier vedrørende gratis vaccinationer mod smitsomme sygdomme m. v.

Fremsat den 4. november 1976 af indenrigsministeren.

I medfør af § 2 i lov nr. 000 af 00. 1977 om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme fastsætter sundhedsstyrelsen herved følgende retningslinier for de profylaktiske børnevaccinationer:

*Kighostevaccination* foretages særskilt og gives 3 gange på følgende alderstrin:

1. når barnet er 5 uger.
2. når barnet er 9 uger.
3. når barnet er 10 måneder.

*Difteri-, tetanus- og polio(Salk)vaccine* gives som blandingsvaccine, Di-Te-Pol, 3 gange på følgende alderstrin:

1. når barnet er 5 måneder.
2. når barnet er 6 måneder.
3. når barnet er 15 måneder.

*Polio (oral, Sabin) vaccination* gives normalt efter de i 1. og 2. leveår fuldførte salkvaccinationer ved de sædvanlige profylaktiske børneundersøgelser ved 2, 3 og 4 års alderen, dvs. på følgende alderstrin:

1. når barnet er ca. 2 år.
2. når barnet er ca. 3 år.
3. når barnet er ca. 4 år.

Vaccination mod *tuberkulose* foretages i den undervisningspligtige alder, hvis tuberkulinprøven er negativ.

Ovennævnte tidspunkter kan fraviges, hvor det findes lægeligt indiceret, samt hvor forhindringer, som f. eks. ophold i udlandet, gør det påkrævet.

*Difteri-, tetanus- og polio (Salk) vaccine* kan gives som enkeltkomponenter, hvis dette er lægeligt indiceret.

*Kighostevaccine*: Siden 1969, hvor kighostevaccinen blev taget ud af triplevaccinen (difteri-tetanus-kighoste), er vaccinationen foretaget særskilt.

Gennemførelsen i en tidlig alder skyldes ønsket om dels at give barnet en tidligere

beskyttelse mod sygdommen, dels at undgå kighostevaccination på et tidspunkt, hvor infantile spasmer hyppigt forekommer.

Om kontraindikationer, bivirkninger, opbevaring og dosering henvises der til den med vaccinen følgende brugsanvisning.

*Difteri, tetanus og poliovaccine (Di-Te-Pol)*: Vaccinen blev indført i 1969, hvor indholdet af alle komponenter blev forøget og antallet af vaccinationer nedsat fra 4 til 3. Vaccinen indeholder inaktiveret poliovaccine type 1, 2 og 3 (Salk).

Om reaktioner, opbevaring og dosering henvises der til den med vaccinen følgende brugsanvisning.

*Oral poliovaccine*: Vaccinen indeholder levende afsvækket poliovirus type 1, 2 og 3 (sabin).

For at opnå optimal antistofstigning bør oral poliovaccine først gives  $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  år efter sidste Di-Te-Pol vaccination.

Om opbevaring og dosering henvises der til den med vaccinen følgende brugsanvisning.

*Børn og unge, der ikke eller kun ufuldstændigt er vaccineret mod polio:*

Såfremt et barn eller en ung ikke eller kun ufuldstændigt er vaccineret mod polio, bør lægen drage omsorg for, at der i det mindste gives oral vaccine, således at den pågældende har fået i alt 3 orale vaccinationer.

*Interval mellem forskellige vaccinationer*: Efter enhver vaccination bør der gå nogen tid, før der gives andre vacciner. Det tilrådes, at den korteste periode bliver:

1 uge efter injektion af difteri-, tetanus-, polio- og kighostevaccine eller kombinationer heraf. Som nævnt bør der dog gå mindst  $\frac{1}{2}$  år mellem injektion af inaktiveret poliovaccine (Salk) og den orale poliovaccine (Sabin).