

viser, at de eksisterende danske producenter af sådanne anlæg i de nærmeste år vil være i stand til at øge kapaciteten svarende op til ca. 3.000 anlæg om året. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i 1986 er produceret ca. 1.200-1.300 anlæg. På denne baggrund er det i dag usikkert om der selv med en væsentlig import kan skabes forudsætninger for realisering af NPO-planens investeringer på kvalitetsmæssig forsvarlig basis inden udgangen af 1989 som forudsat i NPO-planen.«

Miljøministeriet deler ikke denne vurdering.

Der henvises i øvrigt til de afgivne svar på spørgsmål H 104, 136 og 164. Hvad angår konsekvenserne af eventuelle særregler for ældre landmænd, henvises til besvarelsene af spørgsmål H 34, H 116 og H 126.

Ad 2 a-d

Systematisk gødningsplanlægning omfatter en kraftig styrkelse af rådgivnings- og vejledningsarbejdet gennem det af Landbrugsministeriet i samarbejde med landbrugets konsulenttjeneste planlagte program for en forbedret gødningsanvendelse i landbruget.

For yderligere at sikre en forbedret udnyttelse af husdyrgødningen skal der udarbejdes et samlet gødningsbudget for anvendelsen af husdyrgødningen på den enkelte bedrift som en del af en markskitse/gødningsplan.

Det vil i de fleste situationer ikke være foreneligt med godt landmandskab at udbringe hele den, ifølge harmonibestemmelserne i NPO-planen, tilladte husdyrgødningsmængde til vintersæd og efterafgrøder om efteråret. Efterårstildelingen af husdyrgødning må således i højere grad afpasses efter afgrødernes behov ved hjælp af den systematiske gødningsplanlægning.

Det er Landbrugsministeriets opfattelse, at en yderligere forbedring af udnyttelsen af husdyrgødningen vil kunne opnås gennem en fastlæggelse af en vejledende norm for den maksimale tilførsel af efterårsudbragt husdyrgødning til vintersædsarealer og arealer udlagt med efterafgrøder, svarende til 85 kg N pr. ha, samt at der i perioden fra høst til 15. oktober ikke udbringes husdyrgødning til efterafgrødearealer. Kvælstofbehov til efterafgrøder til foderformål skal dog kunne dækkes gennem tilførsel af husdyrgødning.

For den enkelte bedrift kan normerne opfyldes gennem naboaftaler.

Som supplement til den systematiske gødningsplanlægning er der behov for at iværksætte et teknisk udviklingsarbejde vedrørende nyt udstyr til nedbringning af husdyrgødning.

Disse retningslinjer danner grundlag for konsulenttjenestens rådgivning om gødningsanvendelsen på den enkelte bedrift.

Retningslinjerne lægges endvidere til grund for vurderingen af den enkelte ejendoms behov for gødningsopbevaringskapacitet.

Gennemførelsen af den systematiske gødningsplanlægning for alle bedrifter skønnes at ville medføre et behov for yderligere 50 mill. kr. til dette gødningsplanlægningsprogram.

Det er af Statens Jordbrugstekniske Forsøg vedrørende forbedret spredningsteknik vurderet, at det teoretisk er muligt at nedsætte gødningsforbruget uden udbyttenedgang gennem en bedre gødningsfordeling. I praksis skønnes det, at handelsgødningsforbruget kan nedbringes med ca. 5 pct. gennem bedre fordeling, hvilket skønnes at kunne reducere udvaskningen med omkring 5.000 tons N.

Etableringen af grønne marker gennem udvidet dyrkning af efterafgrøder og halmnedmuldning kombineret med en ændring i dyrkningsteknikken er en forholdsvis sikker foranstaltning til at reducere kvælstofudvaskningen fra markerne i efterårsperioden. Den væsentligste indsats i »grønne marker«-strategien vil være en udvidet efterafgrødedyrkning. Udvidelsen af efterafgrødedyrkningen vil kræve tilpasninger i dyrkningsteknikken.

I regeringens handlingsplan omfatter betegnelsen grønne marker efterafgrøder, vintersæd, græsarealer, vinterraps, majs og rodfrugter (kartofler og roer).

Ifølge Danmarks Statistik udgjorde det eksisterende areal med grønne marker efter denne definition i 1986 i alt 1.326.000 ha.

Derudover anses det for muligt at indpasse omkring 900.000 ha med efterafgrøder og halmnedmuldning i det eksisterende sædskifte.

Der forudsættes foretaget halmnedmuldning på omkring 300.000 ha. Dette vil, afhængig af sædskiftemæssige, klimatiske, og jordbundsmæssige forhold kunne ske på arealer, der er ubevoksede efter høst, eller i