

sygehus. Ved modtagelsen registreres personnummer og navn i et edb-register med kodet adgang. Blodprøven påføres instituttets løbenr., inkl. dato.

Til senere opsporing af en patient vil man igennem indsenderen kunne udnytte det omtalte edb-register, eventuelt påført adresse. Sådan brug vil kunne tillades af et særligt udvalg under det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Registertilsynet.

Det er indlysende, at stærkest mulig bekæmpelse af sygdommen kræver mest mulig viden om dens udbredelse.

Udenlandske undersøgelser⁴⁾ har vist, at udbredelsen af HIV-smitte er op til fem gange større blandt personer, som afslår tilbud om HIV-test, end blandt personer, der accepterer en test. Derfor må den ikke være frivillig.

¹⁾ Ugeskrift for Læger 152/13, 25.03.1990 (p. 959).

²⁾ Kirurgen Dennis Raahave og bakteriologen Annie Bremmelgaard, Frederiksberg Hospital, offentliggjorde i november 1989 i Ugeskrift for Læger simple statistiske beregninger, der sandsynliggjorde, at udbredelse af HIV-smitte blandt kirurger og hjælpepersonale vil finde sted i dette omfang.

³⁾ Spørgsmål nr. S 1333, folketingsåret 1986-87, 1. samling, jf. Folketingstidende, forhandlingerne sp. 13594, fra Camre (S), besvaret skriftligt af daværende indenrigsminister Knud Enggaard.

⁴⁾ Hull H.F., Bettinger C.J., Oallaker M.M., Keller N.M., Nielsen J. og J. Menz O.J.: Comparison of HIV-Antibody prevalence in Patients Consenting to and declining HIV. Antibody testing in an STD clinic, JAMA 1988.