

også omfatter ST DT 104. Men der er i disse lande ikke iværksat forholdsregler som specifikt retter sig mod ST DT 104.

Nedenstående oversigt viser udviklingen i Typhimurium DT 104 i en række EU-lande. Tallene stammer fra nyhedsbreve for salmonella referencelaboratorierne inden for EU. Da overvågningsprogrammerne i medlemslandene er forskellige, er sammenligning mellem landene behæftet med usikkerhed. Ikke desto mindre viser tallene klart at multiresistent Typhimuri-

um DT 104 har en betydelig udbredelse inden for EU. Ud over de nævnte lande vides multiresistent DT 104 at forekomme i Belgien, Frankrig og Luxembourg.

Til sammenligning er multiresistent DT 104 til dato påvist i 25 danske besætninger med svin og/eller kvæg. Heraf er de 11 fundet smittet i forbindelse med udredning af smittetilstande. Selv om den faktiske forekomst af DT 104 i Danmark ikke er kendt, tyder alle hidtidige fund på at den er lav.

Udvikling i udbredelse af multiresistent Salmonella Typhimurium DT104 i EU

Land		1991	1992	1993	1994	1995	1996	Kommentar
England	Kvæg			45	62	70	82	Pct. af Typhimurium fund
	Svin			12	28	36	42	
	Kyllinger			26	61	73	74	
Tyskland	Kvæg		0,4	11	38	40	62	Pct. af alle salmonella
	Svin		4	4	4	15	31	
	Fjerkræ		0	2	8	2	43	
Østrig	Mennesker	4	5	9	17	23	48	Pct. af Typhimurium fund
	Levnedsmidler og dyr						23	
Italien	Fjerkræ						27	Pct. af Typhimurium fund
Holland	Kvæg	2	3	2	2	5	8	Pct. af alle salmonella fund
	Svin	1	7	6	7	5	10	
	Kyllinger	0,2	1	2	2	0,4	0,4	
	Mennesker	1	1	2	2	3	6	

Spm. nr. S 976

Til miljø- og energiministeren (29/7 98) af:

Christian H. Hansen (DF):

»Foreligger der oplysninger eller analyser af ukrudtsmidlet Round-Up, der kan give klart svar på, om planter sprøjtet med Round-Up senere kan udgøre en risiko for folks helbred?«

Begrundelse

Oplysninger i dagspressen om, at landmænd sprøjter korn med ukrudtsmidlet Round-Up indtil 10 dage før høsten er dybt skræmmende.

Specielt på baggrund af, at Round-Up længe har været mistænkt for at være kræftfremkaldende. Hvis det betyder, at fødevarer der inden forarbejdningen er sprøjtet med Round-Up også kan medføre kræft, er situationen uacceptabel.