

Spm. nr. S 3299

Til indenrigs- og sundhedsministeren (14/5 03) af:

Peter Brixtofte (UFG):

»Hvor stor er helbredsprocenterne for kræftpatienter i Danmark sammenholdt med de øvrige EU-lande og USA?«

Svar (4/6 03)

Indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen):

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at det er vanskeligt at sammenligne overlevelse i forskellige lande, da overlevelse ikke opgøres ensartet i hele EU. Der findes således ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger ikke en sammenlignelig opgørelse af overlevelsen efter kræft i de enkelte EU lande.

Jeg kan dog oplyse, at kræftstyregruppen i 2000 fik udarbejdet en sammenlignelig analyse af overlevelsen efter fem af de største kræftformer i de nordiske lande. Ifølge denne analyse var overlevelsen efter lungekræft, brystkræft, endetarmskræft og tyktarmskræft op mod 10 % dårligere i Danmark end i de andre lande, mens Danmark var på niveau med de andre lande mht. testikelkræft.

En opgørelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at overlevelsen i Danmark efter en kræftdiagnose som helhed er forbedret. Der er således sket væsentlige forbedringer i overlevelsen for de hyppigste kræftsygdomme som tarmkræft, brystkræft, modermærkekræft og blærekræft samt for ikke så hyppige kræftformer som livmoderhalskræft, livmoder-, nyre-, testikel- og hjernekræft og kræft i blodbanerne.

Feks. er femårs overlevelsen af brystkræft forbedret fra 70 % for patienter diagnosticeret i 1981-1985 til 77 % for patienter diagnosticeret i 1991-1995.

Ligeledes er overlevelsen af lungekræft forbedret. Dansk Lunge Cancer gruppe har oplyst, at femårs overlevelsen efter lungekræft tidligere har været på ca. 5 %, men at den nu er på ca. 8 % for patienter diagnosticeret i 1996, og Dansk Lunge Cancer Gruppe forventer, at overlevelsen er steget yderligere for patienter diagnosticeret senere end 1996.

De nævnte analyser omfatter kræftpatienter diagnosticeret frem til 1995/96, dvs. patienter,

som var diagnosticeret før kræftplanen (2000) og de efterfølgende initiativer på kræftområdet. Det kan tage op til 10 år at dokumentere forbedringer i overlevelsen af kræft efter nye tiltag. Kræftplanens tiltag må således forventes at forbedre overlevelseshistogrammet yderligere i de kommende 7-10 år.

Spm. nr. S 3300

Til indenrigs- og sundhedsministeren (14/5 03) af:

Peter Brixtofte (UFG):

»Hvor lang tid går der i gennemsnit fra det tidspunkt, hvor en patient henvender sig med en kræftsygdom eller anden livstruende sygdom til sin læge, indtil patienten modtager en egentlig behandling?«

Svar (28/5 03)

Indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen):

Jeg kan oplyse, at ventetiden i Landspatientregistret opgøres som tiden fra lægen har henvist patienten til behandlingen påbegyndes. I 2002 var den gennemsnitlige ventetid til en kræftbehandling ifølge Landspatientregistret 41 dage. Dette inkluderer godartede svulster. I den sammenhæng bør det nævnes, at ventetiden til behandling for ondartede svulster i 2002 var 27 dage.

I 2002 var ventetiden til en bypass-operation 22 dage, mens ventetiden til en ballonudvidelse var 27 dage.

Spm. nr. S 3301

Til indenrigs- og sundhedsministeren (14/5 03) af:

Peter Brixtofte (UFG):

»Hvor mange patienter tilbydes relevant behandling i udlandet, såfremt den tilstrækkelige ekspertise ikke findes i Danmark?«