

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere							
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

16.21.62. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitutionsbehandling ved opioidmisbrug i "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug".

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,0	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Behandling af personer for stofmisbrug							
Udgift	1,0	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) (Reservationsbev.)

Der blev i forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0 mio. kr. i 2009 (2008 pris- og lønniveau) til forberedelse og indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kombination med oral metadon til stofmisbrugere.

I forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2009 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009 pris- og lønniveau) til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.

Fra og med 2010 udmøntes 0,2 mio. kr. årligt af midlerne til Sundhedsstyrelsens monitorering af ordningen. Resten udmøntes til dækning af de etablerings- og driftsomkostninger, som ordningen med lægeordineret heroin vil medføre for de kommuner, der indfører ordningen. Spørgsmålet om efterregulering tages op efter 2 år.